

	Utilisation de l'adhésif chez l'enfant de moins de 36 mois			Référence :	
	Service Emetteur	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	N° Version
Pole FME	Equipe EPP*	CDS Pédiatrie	Médecin chef de service	Date d'application :	
Date	20/02/2017				
Date modification programmée :					
Type de révision :				N° Révision	
Modifications portées :				Le / /	

Objet : optimiser l'utilisation des adhésifs

Objectif : diminuer la douleur induite par l'utilisation des adhésifs lors de différents soins.

Domaine d'application : enfant de moins de 36 mois, hors cadre de l'urgence

Personnel concerné : médecins, puéricultrices, infirmières, sages-femmes, aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, étudiants en soins infirmiers, élèves auxiliaire de puériculture

Soins invasifs	Bonnes pratiques
Pose de crème anesthésiante pour ponctions veineuses, vaccins	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation du film alimentaire • Elastomousse • Bandes de crêpe • A défaut pansement adhésif fourni avec la crème
Pose de crème anesthésiante pour ponctions lombaires, myélogrammes	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif fourni avec la crème
Pansement après bilan sanguin	<ul style="list-style-type: none"> • Compresses stériles pliées en triangle et posées autour du membre ponctionné • Compresses stériles en tampon maintenues avec élastomousse et/ ou bande et/ ou filet
Pansement après ponction lombaire	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif stérile
Pansement après test de Guthrie	<ul style="list-style-type: none"> • Compresses stériles pliées en triangle et posées autour du membre ponctionné
Pansement après ponction pleurale	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif stérile
Pansement après ablation KTVO	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif stérile
Pansement après ablation du drain thoracique	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif stérile
Collecteur à urines	<ol style="list-style-type: none"> 1. ECBU <ul style="list-style-type: none"> • Percussion vésicale, si échec : pose d'urinocol 2. Prélèvements non stériles <ul style="list-style-type: none"> • Compresses dans la couche puis mettre la compresse dans une seringue de 10 ml et presser au dessus d'un pot non stérile.

*Groupe EPP : Bailet Anne-Lise, Calarco Cécile, Crespe Carine, Kolosa Annie, Senechal Stephanie

Surveillances	Bonnes pratiques
Maintien du Capteur à oxymètre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jusqu'à 3 mois : <ul style="list-style-type: none"> • Couper le ruban adhésif du capteur • Utiliser une bande pour le maintenir 2. Après 3 mois : <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas couper le ruban adhésif du capteur • Le maintenir avec une bande ou une chaussette
Maintien de la Sonde de température cutanée de l'incubateur, du tunnel et de la table de réa	<ul style="list-style-type: none"> • Couvre sonde gélatinifié uniquement
Maintien de la sonde de température cutanée du scope	<ul style="list-style-type: none"> • Retirer la mousse blanche fournie avec la sonde patient unique • Utiliser couvre sonde gélatinifié
Maintien des électrodes su Scope	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas rajouter d'adhésif sur les électrodes
Maintien de la sonde naso gastrique	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un pansement hydrocolloïde sous l'adhésif de maintien adapté à la taille du visage de l'enfant • Adhésif ne doit pas être en contact avec la peau
Maintien des Lunettes à oxygène	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un pansement hydrocolloïde sous l'adhésif de maintien • Adhésif ne doit pas être en contact avec la peau
Maintien de la voie veineuse	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif stérile transparent
Maintien après KTVO	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif stérile transparent
Maintien de la sonde d'intubation	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser si possible un pansement hydrocolloïde sous l'adhésif de maintien adapté à la taille du visage de l'enfant • Adhésif si possible de la taille du pansement hydrocolloïde
Maintien du drain thoracique	<ul style="list-style-type: none"> • Pansement adhésif stérile

Retrait de dispositifs divers	Bonnes pratiques
Pansement stérile adhésif transparent ou non	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser du liniment oléo calcaire ou eau + savon
Ablation voie veineuse	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre sur point de ponction compresses stériles, bandes et / élastomousse et / ou filet