

Dépistage du COVID-19 chez la femme enceinte

Questionnaire
Dépistage
COVID

SIGNES ÉVOCATEURS

Fièvre $\geq 38,5$ °C
Signes ORL : gêne respiratoire, toux
Contact avec cas COVID +

Autres signes :

- ✓ Signes digestifs : diarrhée, vomissements
- ✓ Essoufflement
- ✓ Douleur pharyngée
- ✓ Anosmie brutale, agueusie
- ✓ Douleurs thoraciques
- ✓ État fébrile avec phases hypo/hyperthermie

Fiche
« Quel masque
porter en ville ? »

Au moindre doute
⇒ Tester

COMORBIDITÉS

3^{ème} trimestre de la grossesse

Surpoids (IMC ≥ 25 kg/m²)

Diabète insulino-dépendant ou requérant compliqué
Asthme

+

Insuffisance respiratoire chronique sous O₂, mucoviscidose

Insuffisance rénale chronique dialysée

Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

Cirrhose \geq stade B


Toute pathologie chronique qui peut décompenser sur infection virale

Immunodépression, Greffe d'organe, Hémopathie maligne, Cancer métastaté

Signes de gravité :

- 🔥 Polypnée > 22 / min.
- 🔥 SpO₂ < 98 % en air ambiant
- 🔥 PAs < 90 mmHg
- 🔥 Altération de la conscience
- 🔥 Déshydratation

* : PACHOR =
Pneumopathie
Aiguë
Communautaire
Hypoxémiante
Oxygéo-
Requérante



Liste ARS des labos
proposant le test
au 25/03/2020

Cas possibles pour les femmes enceintes
=
Fièvre et/ou signes respiratoires

ATTENTION
PCR COVID → 30 % de faux négatifs

Pas de signe de gravité
Pas de comorbidité

Si comorbidité(s)
et/ou ≥ 28 SA

≥ 1 signe de gravité

Test COVID
en ambulatoire

Évaluation en Maternité :
Test COVID \pm TDM thoracique

