

VACCINATIONS ET GROSSESSE

FICHE DE SYNTHÈSE

VACCINS INACTIVES : données d'innocuité souvent insuffisantes, seulement certains autorisés durant la grossesse
VACCINS VIVANTS ATTENUÉS : contre-indiqués pendant la grossesse

Consultation pré conceptionnelle :

⇒ Vérifier statut vaccinal : ROR, varicelle +++ et respect du calendrier vaccinal	
⇒ Proposer vaccinations :	
ROR	Varicelle
<i>Si sérologie rubéole négative et absence de 2 doses de vaccin antérieur</i>	<i>si IgG-VZV négative</i>
1 dose si née avant 1980 ; 2 doses si née après 1980: Priorix® ou M-M-RVaxpro®	2 doses de vaccins espacées de 4 à 8 semaines (Varivax®) ou de 6 à 10 semaines (Varilrix®)

Durant la grossesse :

Vaccins recommandés	Vaccins autorisés si risque particulier	Vaccins à éviter voire contre indiqués (manque de données d'innocuité)	Vaccins toujours contre indiqués
<p>Grippe saisonnière Vaxigrip®, Influvac Tetra®, Fluarix Tetra® 1 dose</p> <p>COVID Comirnaty®, Spikevax® 1 dose co adm avec grippe</p> <p>Coqueluche Bootstrix Tetra® ; Repevax® 1dose entre 20 et 36SA</p>	<p><i>Si voyage</i> : Hépatite A et B, méningocoques, fièvre jaune</p> <p>Rage, encéphalite à tique <i>En fonction bénéfice/risque</i></p>	<p>Méningocoque, typhoïde, pneumocoque, hépatite A, encéphalite japonaise = vaccins inactivés</p> <p><i>Une vaccination réalisée par mégarde, chez une femme enceinte ne justifie pas une interruption de la grossesse</i></p>	<p>BCG, rubéole, oreillons, rougeole, varicelle = vaccins vivants atténués</p>

Après la grossesse :

Vaccins recommandés si non immunisée	Allaitement*	Vaccins recommandés si risque particulier
Rubéole (ROR), varicelle, coqueluche (+ cocooning)	Tous les vaccins sont autorisés à l'exception de la fièvre jaune	Pneumocoque, hépatite B, fièvre jaune*, méningocoque

Coqueluche et cocooning *si absence de vaccination en cours de grossesse*

Pourquoi ?

Stratégie de **protection indirecte des nourrissons < 6 mois des coqueluches graves** par la vaccination de leurs proches, y compris avant même la grossesse

Pour qui ?

Toutes personnes susceptibles d'être en contact étroit avec le nourrisson au cours des six premiers mois de vie: parents, fratrie, grands-parents, baby-sitters...) au plus tard à la naissance de l'enfant (de préférence en fin de grossesse)



Vaccination : êtes-vous à jour ?

2023 calendrier simplifié des vaccinations

Âge approprié	Vaccinations obligatoires pour les nourrissons								6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +	
	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois							
BCG	■														
DTP		■	■	■		■			■	■		■	■	■	Tous les 10 ans
Coqueluche		■	■	■		■			■	■		■			
Hib		■	■	■		■									
Hépatite B		■		■		■									
Pneumocoque		■		■		■									
ROR								■	■						
Méningocoque C						■		■							
Rotavirus		■	■	■											
Méningocoque B			■		■		■								
HPV										■	■				
Grippe															Tous les ans
Zona															

Tuberculose (BCG)

La vaccination contre la tuberculose est le plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP)

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

Coqueluche

Le rappel de l'adulte contre la coqueluche se fait à 25 ans avec rattrapage possible jusqu'à 39 ans. La vaccination contre la coqueluche de la femme enceinte dès le 2^e trimestre de grossesse est recommandée pour protéger son nourrisson.

Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu'à l'âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l'âge).

Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1^{re} année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les per-

Pneumocoque

Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée chez l'enfant et l'adulte à risque.

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

Méningocoque C

À partir de l'âge de 12 mois et jusqu'à l'âge de 24 ans inclus, une dose unique est recommandée pour ceux qui ne sont pas déjà vaccinés.

Rotavirus

Recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois. Deux à trois doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

Méningocoque B

Un rattrapage est possible jusqu'à l'âge de 2 ans pour les nourrissons n'ayant pas reçu les trois doses de vaccins recommandées à 3, 5 et 12 mois.

Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. De plus, la vaccination est recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des

Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité (IMC > 40 kg/m²). La vaccination contre la grippe sera désormais proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.

Vaccination Covid

Retrouvez le schéma vaccinal actualisé sur vaccination-info-service.fr

Pour en savoir plus

**VACCINATION
INFO SERVICE.FR**



Mise à jour : mars 2023

DT07-016-23 PC

* vaccin fièvre jaune : Recommandation HSCP 2014 en Guyane administration d'une seconde dose de vaccin est recommandée pour les femmes primo-vaccinées en cours de grossesse.